

## GHID PENTRU PACIENT

**Suliqua 100 unități/ml + 50 micrograme/ml  
soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut**  
**Suliqua 100 unități/ml + 33 micrograme/ml  
soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut  
(insulină glargin + lixisenatidă)**

ACEST GHID ESTE DESTINAT EXCLUSIV ÎNDRUMĂRII PACIENȚILOR. ÎNAINTE DE A UTILIZA MEDICAMENTUL SULIQUA, TREBUIE SĂ FIȚI INSTRUIT PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A STILOULUI INJECTOR (PEN-ULUI) SULIQUA SOLOSTAR DE CĂTRE UN PROFESIONIST DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ȘI TREBUIE SĂ CITIȚI CU ATENȚIE PROSPECTUL PENTRU PACIENT ȘI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE CARE ÎNSOȚESC STILOUL INJECTOR (PEN-UL).

Păstrați acest ghid. S-ar putea să fie necesar să îl recitiți. Scrieți-vă numele pe acest ghid:

Stilourile injectoare (pen-urile) preumplute SULIQUA asigură administrarea simultană a insulinei glargin și a lixisenatidei într-o singură injecție, administrată o dată pe zi.

Medicamentul SULIQUA este disponibil în 2 stilouri injectoare (pen-uri) preumplute, care conțin 2 concentrații diferite de lixisenatidă și au intervale diferite pentru dozele de insulină glargin 100 unități/ml. Medicul dumneavoastră v-a prescris stiloul injector (pen-ul) potrivit pentru necesarul dumneavoastră de insulină.


**Stiloul injector  
(pen-ul) SULIQUA 10-40**

SULIQUA 100 unități/ml + 50 micrograme/ml  
SOLUȚIE INJECTABILĂ ÎN STILOU  
INJECTOR (PEN) PREUMPLUT



**Stiloul injector  
(pen-ul) SULIQUA 30-60**

SULIQUA 100 unități/ml + 33 micrograme/ml  
SOLUȚIE INJECTABILĂ ÎN STILOU  
INJECTOR (PEN) PREUMPLUT



- Ambele stilouri injectoare (pen-uri) preumplute conțin insulină glargin cu o concentrație de 100 unități/ml.
- Stiloul injector (pen-ul) SULIQUA (10-40) trebuie utilizat pentru administrarea unei doze zilnice cuprinsă între 10 și 40 trepte de dozare (concentrație: insulină glargin 100 unități/ml și lixisenatidă 50 micrograme/ml; intervalul de doze al acestui stilou este de la 10 până la 40 de unități de insulină glargin, în combinație cu 5 până la 20 micrograme de lixisenatidă). Acest stilou injector (pen) are culoarea piersicii și un buton de injectare portocaliu.

- Stiloul injector (pen-ul) SULIQUA (30-60) trebuie utilizat pentru administrarea unei doze zilnice cuprinsă între 30 și 60 trepte de dozare (concentrație: insulină glargin 100 unități/ml și lixisenatidă 33 micrograme/ml; intervalul de doze al acestui stilou este de la 30 până la 60 unități de insulină glargin în combinație cu 10 până la 20 micrograme lixisenatidă). Acest stilou injector are culoarea oliv și un buton de injectare maro.
- O treaptă de dozare conține o unitate de insulină glargin 100 unități/ml plus o cantitate corespunzătoare de lixisenatidă. Înainte de a utiliza SULIQUA, fiți atent la câte trepte de dozare vă sunt prescrise. Medicul dumneavoastră v-a dat aceste informații.
- Indicatorul (fereastra) dozei de pe stiloul injector (pen-ul) preumplut indică numărul de trepte de dozare care urmează să fie injectate.
- Prescripția medicală trebuie să menționeze ce tip de stilou injector preumplut trebuie să utilizați [stiloul SULIQUA (10-40) sau stiloul SULIQUA (30-60)] și numărul de trepte de dozare care trebuie injectate.
- Farmacistul trebuie să clarifice împreună cu medicul prescriptor orice prescripție incompletă.

#### **NU UITAȚI:**

- Medicamentul SULIQUA este furnizat într-un stilou injector (pen) preumplut și trebuie administrat numai cu acest dispozitiv. Pacienții, persoanele care îi îngrijesc și profesioniștii din domeniul sănătății nu trebuie să extragă niciodată cu seringă medicamentul SULIQUA din stiloul injector (pen) preumplut, deoarece pot apărea erori de administrare și vătămări grave. Înainte de fiecare utilizare, trebuie atașat întotdeauna un ac nou. Acele nu trebuie niciodată reutilizate.
- Pentru SULIQUA, o treaptă de dozare conține întotdeauna o unitate de insulină glargin 100 unități/ml, indiferent de stiloul injector (pen-ul) preumplut SULIQUA utilizat [stiloul injector (pen-ul) SULIQUA (10-40) sau stiloul injector (pen-ul) SULIQUA (30-60)].
- Profesionistul dumneavoastră din domeniul sănătății vă va explica designul și caracteristicile stiloului dumneavoastră injector (pen-ului) SULIQUA SoloStar, inclusiv modul în care fereastra dozei de pe stiloul injector (pen-ul) preumplut indică numărul de trepte de dozare care urmează să fie injectate.
- În cursul schimbării tratamentului cu această combinație de medicamente și în săptămânile ulterioare acestei schimbări, trebuie să vă măsurați mai frecvent valorile glicemiei.
- Dacă aveți orice întrebări despre tratamentul pe care îl luați, adresați-vă medicului dumneavoastră.

## ÎNAINTE DE A ADMINISTRA SULIQUA



Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și Prospectul pentru pacient, care sunt furnizate împreună cu medicamentul, în cutie.



Dacă nu urmați toate aceste instrucțiuni, este posibil să vă injectați fie prea mult, fie prea puțin medicament. Vă rugăm să raportați medicului dumneavoastră orice erori de administrare suspectate a fi asociate cu utilizarea stiloului injector (pen-ului) SULIQUA SoloStar.

### Apel la raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, către:

#### **Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România**

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

011478 - București

Fax: +4 0213 163 497; e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

<https://adr.anm.ro/>

Reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către deținătorul autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact:

#### **Sanofi Romania SRL**

Str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajele 8-9

Sector 2, București, România

e-mail: [pv.ro@sanofi.com](mailto:pv.ro@sanofi.com); Tel: 021 317 31 36; Fax: 021 317 31 34

